

DE SCHIJNDRACHT VAN EEN BOA CONSTRICTOR.

Door: Jan van Loon, Klaverstraat 6, 5038 RC
Tilburg.

Inhoud: Het terrarium - De slangen - De paring -
De schijndracht.

HET TERRARIUM

Het terrarium dat in de huiskamer staat, heeft een door de slangen te benutten ruimte van 170x95x200 cm (lxbxh).

Het terrarium is in zijn geheel opgebouwd uit hout, geheel dubbelwandig en opgevuld met isolerend materiaal. Aan de linkerkant zit een raam van 70x160 cm, aan de voorzijde een raam van 150x100 cm en een schuifraam van 150x100 cm. De wanden en plafond zijn in zijn geheel betimmerd met in de lengte doorgezaagde, halfronde boomstammetjes. De slangen hebben de beschikking over drie grote halfronde boomstammen, die tevens dienst doen als ligplank, daarnaast zijn er nog vijf forse klimtakken aanwezig. Tevens nog een groot waterbassin. De bodem is bekleed met een soort schuimvinyl. Voor de verlichting zorgt een SL lamp van 8 Watt, wat voldoende licht bezorgt. De verwarming geschiedt door middel van een elektrische hete lucht kachel die gestuurd wordt door een c.v. huiskamer thermostaat.

De temperatuur in de zomermaanden is minimaal 24°C, maximaal 30°C. 's Winters minimaal 22°C, maximaal 28°C. Tevens is in de bodem een aluminium plaat gemonteerd met daaronder een 100 Watt bodemverwarming, die automatisch aanspringt als de temperatuur door welk euvel dan ook onder de 20°C komt. Dit alles wordt geschakeld door een grote schakelklok die ook beveiligd is door een ingebouwde akku. Mocht de stroom in zijn geheel uit-

vallen dan levert de akku toch nog voor een paar uur stroom.

DE SLAGEN

De in mijn bezit zijnde boa's zijn: een man (man 1) van vijf jaar oud en met een lengte van 190 cm. Een kleiner mannetje (man 2) van drie jaar oud en met een lengte van 150 cm.

Een vrouw (vrouw 1) van drie jaar oud en met een lengte van 190 cm.

Een vrouwtje (vrouw 2) van twee jaar oud en met een lengte van 130 cm.

DE PARING

Man 1 was vanaf 13 oktober 1985 heel onrustig, hij kroop konstant door het terrarium en ik vond sperma-slierten in de waterbak.

Op 14 oktober lag hij bovenop vrouwtje 1. Hij lag steeds met zijn sporen over haar lijf te krabben. Zijn kop bevond zich bovenop haar kop en schuierde heel de tijd van links naar rechts, dit is dag en nacht doorgegaan tot op 20 oktober 1985. Het was echt een komisch gezicht. Waar zij naar toe ging, reed hij op haar rug mee. Van 20 oktober 1985 tot 6 december 1985 was het gedrag weer normaal, ze aten en vervelden normaal. Tot mijn verbazing ontdekte ik op 7 december 1985 's avonds, dat hij weer bovenop haar lag. Hij had zijn staart om die van het vrouwtje geslagen, en zijn hemipenis was in de cloaca van het vrouwtje gedrongen. Hoe lang de paring heeft geduurd weet ik niet.

DE SCHIJNDRACHT

Vrouwtje 1 was voor de paring een flinke eter, maar nu weigerde ze al het voedsel, wat ik haar aanbood.

Vanaf 22 december 1985 at zij heel onregelmatig. Zij pakte de rat en wurgde hem. Dan bleef zij soms wel 15 tot 20 minuten met de prooi in de bek liggen voordat zij hem opat.

Op 15 februari 1986 at ze na veel aandringen één dood aangeboden rat van 330 g. Daarna weigerde zij weer voedsel. De eerste maanden heeft zij maar weinig gegeten, terwijl de omvang van haar achterlichaam steeds dikker werd.

In al die maanden was zij ook erg prikkelbaar. Vanaf 10 juli werden in het achterlijf snelle inwendige bewegingen zichtbaar. Op 17 juli 1986 lag het vrouwtje met haar achterlijf in een omgekeerde U-vorm. De cloaca was geopend en er waren krampachtige bewegingen te zien. Dit alles duurde ongeveer 15 minuten. Op 18 juli 1986 was zij aan het vervellen. Na enige weken, vanaf 27 juli 1986, had zij haar normale eetritme weer terug. Vanaf 27 juli 1986 tot 12 september 1986 is het achterlijf weer in zijn normale omvang gekomen.

Op 12 september 1986 was op twee röntgenfoto's in het geheel niets te zien.

Mijn theorie: toen er gepaard werd was vrouwtje 1 nog geen drie jaar oud. Naar mijn mening nog te jong; zij was nog net niet geslachtsrijp, maar had wel duidelijk de prikkeling om te paren.

Ze had alle tekenen van een drachtig wijfje. Schijndracht is volgens mij dus ook bij slangen goed mogelijk.