
AANVULLENDE GEGEVENS OP HET ARTIKEL "DE SLANGEN
VAN SURINAME, DEEL II, DE FAMILIES ANILIIDAE EN
BOIDAE".

(zie "Litteratura Serpentium", Vol. 2, no. 3 blz.
123).

Door A. Abuys, Jukwerderweg 31, 9901 GL Appinge-
dam.

Inhoud: De bruine regenboogboa ook in Suriname - De
eerste waarneming en vangst in Suriname - Vind-
plaats in Suriname - Verspreiding.

DE BRUINE REGENBOOGBOA OOK IN SURINAME!!!

Wetenschappelijke naam : *Epicrates cenchria*
maurus Gray, 1849.
Nederlandse naam : Bruine regenboogboa
Maximum lengte : ca. 180 cm

SCHUBGEGEVENS (Roze, 1966)

Supraoculare : 2
Preoculare : 2
Postoculare : 5
Suboculare : n.a.w.
Loreale : in 2 rijen (bovenste rij met 2 en
de onderste rij met 5 schubben)
Supralabiale : 12 of 13
Sublabiale : 14-16
Temporale : n.v.t.
Dorsale : 46-53 (middenlichaam)
Ventrals : 225-245
Subcaudale : 47-56 (in 1 rij)
Anale : enkel

Kenmerken: volwassen exemplaren zijn dorsaal bruin
tot donkerbruin. Niet al te oude dieren hebben dor-

saal een vage tekening van iets lichtere ronde vlekken. De jongen (pas geboren tot halfwas) hebben een duidelijk zichtbare tekening van ronde lichtbruine vlekken die elkaar meestal niet raken. Lateraal is de basiskleur crème of beige met donderbruine streepvlekken. Bij het ouder worden ver- vaagt de tekening om uiteindelijk min of meer te verdwijnen.

Ventraal is deze soort vuilwit van kleur. Vergele- ken met *Epicrates cenchria cenchria* is *Epicra- tes cenchria maurus* lang niet zo spectaculair in kleur en tekening.

DE EERSTE WAARNEMING EN VANGST IN SURINAME

Tot september 1975 zijn er naar mijn weten geen meldingen geweest van het voorkomen van deze onder- soort in Suriname. September 1975 reed ik met 2



Foto 1. *Epicrates cenchria maurus*. Foto: A. Abuys.

leden van de vereniging "LACERTA" over de kustweg

in de buurt van het plaatsje Nickerie. Het was. ca. 21.30 uur toen wij opeens een slang de weg over zagen steken. Dicht bij het diertje gekomen, herkende ik het direct als een *Epicrates cenchria* spec., echter wel met een tekening die ik nog niet eerder was tegengekomen. Nadat ik jaren later in Nederland de jongen van een *Epicrates cenchria maurus* van dhr. P. Stoel had gezien, was ik er zeker van dat het exemplaar van Nickerie ook een *Epicrates cenchria maurus* was. Het slangetje van Nickerie was toen ook nog maar halfwas en had genoeg dezelfde tekening en kleur als een aantal jongen van een *Epicrates cenchria maurus* van dhr. P. Stoel.

VINDPLAATS IN SURINAME

Als eerste exemplaar in de kuststreek bij Nickerie (A. Abuys, N. Reyst en F. Ensinnck; 1975).

VERSPREIDING

Midden-Amerika, van Costa Rica tot en met Panama; in Zuid-Amerika alleen in Noord-Colombia en in Venezuela; verder op de eilanden Trinidad, Tobago, Margarita en zeer waarschijnlijk langs de kuststreek van de drie Guyana's.