

# KWEEK RESULTATEN

Als U kweekresultaten inzendt, wilt U die dan vergezellen van de belangrijkste gegevens over het verloop van de dracht en de bevalling, het terrarium en de voorgeschiedenis van de ouderdieren. Ook niet gelukte kweken zijn belangrijk: een ander kan er zijn voordeel mee doen.

---

## Thamnophis sirtalis parietalis.

Sinds drie jaar heb ik een paartje van deze slangen in mijn bezit. Zonder enige problemen houd ik ze sinds die tijd in een terrarium van 120x45x50 cm (lxbxh).

De temperatuur is overdag 20-28°C en 's nachts 15-18°C. Op één plaats is door middel van een spotje de temperatuur verhoogd tot ca. 35°C.

Hoewel ik wel verschillende malen met *Thamnophis sauritus proximus* gekweekt heb bleef een kweek met deze slangen uit. In september 1981 kreeg ik, door ruiling van slangen met een mede-terrariaan, er een ander paartje *Thamnophis sirtalis parietalis* bij. Vanaf het moment dat dit paartje bij het eerste stel werd gezet was de belangstelling van het eerste mannetje voor het eerste vrouwtje gewekt; ook het tweede mannetje had grote belangstelling.

Er werd veelvuldig gepaard en het eerste vrouwtje werd tot vervelens toe achterna gezeten. Dit duurde verscheidene weken. Wanneer de eigenlijke bevruchting heeft plaatsgevonden heb ik niet kunnen constateren, maar na enige tijd werd wel duidelijk dat het eerste vrouwtje drachtig was. Gedurende de dracht heeft zij gewoon doorgegeten.

Op 15 maart vervelde het vrouwtje en vier dagen later, op vrijdag 19 maart, wierp ze 27 jongen. Hiervan bleken er echter 16 doodgeboren te zijn. Hoe dit kan is voor mij een raadsel. Alle jongen

waren volledig volgroeid. De dag na de geboorte stierven nog 6 jongen. Het leek wel of deze jongen niet door hun vervelling heen kwamen. De overgebleven 5 jongen waren namelijk direkt na de bevalling verveld. Ze aten allemaal binnen één week zelfstandig. Hun lengte was 17 à 18 cm.

Voor mij blijven er na deze kweek een aantal vragen bestaan. Wie daar antwoord op weet, zegge het, zodat bij een eventuele volgende kweek problemen kunnen worden voorkomen.

Nog een aantal gegevens die mogelijk van belang kunnen zijn:

De ouderdieren zijn minimaal 6 jaar oud. Het is, althans bij mij, de eerste bevalling van dit vrouwtje. Levende en dode jongen werden om en om geboren, alleen de laatste 6-7 waren allemaal dood. Alle jongen waren geheel volgroeid en uit niets bleek wat het gevolg kon zijn van het aantal doodgeboren jongen (bijna 60%! ). De jongen die niet door hun vervelling kwamen zagen er dof en levenloos uit; stukken huid bleven zitten en ze kropen nogal "houterig" door de bak.

René van Marle, Rozemarijnstraat 3, 5281 BZ Boxtel.