

# ZIEKTEN & GEZONDHEID



*Deze rubriek wordt verzorgd door de "Studiegroep voor ziekten, optimaal houden en kweken van terrariumdieren" van de belgische terrariumvereniging "Terra". Mocht U vragen hebben, die in het kader van deze rubriek passen, dan kunt U die rechtstreeks stellen aan de voorzitter van de Studiegroep: H. Claessen, A. Sterckstraat 18, B-2600 Berchem, België.*

---

## HERHAALDE KWEK MET BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR.

*Vraag:* Mijn *Boa constrictor constrictor*-vrouwtje is begin 1978 geboren. Op 3 juni 1980 baarde ze 19 gezonde jongen, 1 dood jong en 2 onbevuchte eieren. Op 7 april 1981 baarde ze 32 gezonde jongen en 9 onbevuchte eieren. Weer een jaar later, op 22 februari 1982, legde ze 29 onbevuchte eieren en slechts één jong, dat echter geen onderkaak had en spoedig stierf. De slang verkeert nu weer in prima conditie en weegt ca. 12 kg. Mijn vraag is nu: kan ik dit vrouwtje zonder gevaar weer laten dekken?

Jan van der Schilt, Strijen.

*Antwoord:* De geleidelijke toename van het aantal onbevuchte eieren komt waarschijnlijk voort uit de betrekkelijk korte intervallen tussen de drachtigheidsperioden van het boa-wijfje. Dit zelfde fenomeen wordt wel bij andere slangen gezien, die kort na elkaar nesten produceren. Te adviseren is het dier een langere rustperiode te gunnen en haar bijvoorbeeld 14-18 maanden ná de laatste geboorte pas weer te laten paren.

Prof. Dr. P. Zwart en C.A.P. van Riel.

REPEATED BREEDING WITH BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR.

*Question:* My female *Boa constrictor constrictor* was born early 1978. She gave birth to 19 live and 1 dead young and 2 non-fertilized eggs on the 3rd of June, 1980. On the 7th of April 1981 32 live young were born plus 9 non-fertilized eggs. Again one year later on the 22nd of February 1982 she laid 29 non-fertilized eggs and only one young was born, but without a lower-jaw (it died soon). However at this time (July 1982) the female is in perfect condition and weighs 12 kg. My question is: is there any danger in letting her copulate again?

Jan van der Schilt, Strijen.

*Answer:* The gradual increase of non-fertilized eggs each year is probably caused by the relatively short intervals between the pregnancies of this female Boa. The same phenomenon occurs in other snakes that produce several litters shortly after one another. We advise a longer period of rest for the female, i.e. a period of 14-18 months after the last birth before letting her copulate again.

Prof. Dr. P. Zwart and C.A.P. van Riel.