

LITERATUUR

In deze rubriek wordt U geïnformeerd over nieuwe literatuur op het gebied van terrariumverzorging en de systematiek van slangen. Ook kan (op speciaal verzoek) af en toe een literatuuroppgave geplaatst worden over de determinatie van de slangen van een bepaald land of van een systematische groep. Tips voor nieuwe literatuur en boekbesprekingen ingezonden door lezers zijn van harte welkom. Redakteur: Ed Prüst, Voorstraat 61, 3512 AK Utrecht. Tel. 030-319347.

Ergänzende Angaben zur Haltung und Zucht von *Vipera ammodytes*; Horst Holzberger. Herpetofauna (Ludwigsburg), 1980, Vol. 2 (9): 32.

De auteur beschrijft een mannelijk exemplaar dat hij van juni 1973 tot juli 1977 in zijn bezit had en in die tijd groeide van ca. 65 cm tot ca. 90 cm (gewicht 280 gram). In deze periode at de slang 72 muizen en vervelde 10 maal. De auteur bezit 2 mannetjes en 1 vrouwtje. Hij voerde nooit met een voederpincet, dat hij echter wel bij de hand hield, indien twee slangen tegelijk een muis wilden opeten.

In de nacht van 4 op 5 april 1975 moeten beide mannetjes om het vrouwtje gestreden hebben, wat te zien was aan de "chaos" in het terrarium.

Op 14 april 1976 werd een paring waargenomen tussen het grootste mannetje en het vrouwtje. Begin mei 1976 werd het vrouwtje dikker. Precies 113 dagen na de paring, op 5 augustus, werden 7 jongen geboren (lengte: 20, 22 en 23 cm, gewicht: 7,0, 8,21, 9,80, 9,85, 9,90, 10,30 en 10,50 gram).

Vijf dagen later stierf het vrouwtje, waarbij na het openen van het lichaam, 4 volledig gevormde en dode jongen (lengte 22-23 cm) gevon-

den werden. Het enige jong dat de schrijver zelf hield, at drie weken na de geboorte een *Rana esculenta* en werd hiermee gevoerd tot hij nestmuizen aannam.

Erfahrungen mit der Mangroven-Nachtbaumnatter oder Ulaburong (*Boiga dendrophila*); Klaus W. Neier. Herpetofauna (Ludwigsburg), 1981, Vol. 3 (12): 19-20.

De auteur wijst eerst op het gevaar van opistoglyfe slangen. Onder andere Robert Mertens werd door zo'n slang gedood.

De slangen van de auteur waren actief van 22.00 uur tot 03.00 uur. Als voer werd aangenomen: kippeëieren, kuikens, muizen en door de grotere exemplaren (tot 240 cm) ook ratten. De voederdieren werden van te voren altijd gedood om het risico van verwondingen van de slangen te voorkomen.

Het terrarium moet ruim en hoog zijn. De luchttemperatuur schommelde tussen 28 en 35°C overdag. Gedurende twee maanden per jaar lag de temperatuur 6 graden lager. De relatieve luchtvochtigheid lag tussen de 60 en 95%. Verder was er een droge, warme plek aanwezig en een grote verwarmde waterbak. Er werd regelmatig gesproeid, wat vaker tijdens het "moessonseizoen", iets wat voor een natuurlijke levenswijze noodzakelijk is. Ondanks het feit dat *Boiga dendrophila* 's nachts actief is, schijnt het goed te zijn om overdag felle, U.V. bevattende TL buizen te gebruiken.

Als *Boiga*-soorten moeilijk houdbaar zijn, vooral in het eerste jaar, zou dit voornamelijk te wijten zijn aan de slechte behandeling door sommige handelaren.

De slangen van de auteur waren slechts zelden agressief, overdag nooit. Als ze 's nachts actief waren, vielen ze hem wel aan, maar ze beten hem niet.