

KWEEK RESULTATEN

Wanneer U kweekresultaten inzendt, wilt U dat dan s.v.p. doen met behulp van het speciale kweekmeldingsformulier, dat U bij mij kunt aanvragen? Graag per kweek één formulier. Ook mislukte kweken zijn van belang: een ander kan er profijt van hebben. Het is niet de bedoeling dat alleen "bijzondere" kweken gepubliceerd worden. Vergelijken van verschillende kweekcondities kan voor iedere kweker een grote hulp zijn, ook als het om "gemakkelijk" te kweken soorten gaat. Jacqueline Donkers, Mariendaal 407, 6715 CC Ede. Tel. 08380-20830.

Eryx colubrinus loveridgei (Keniaanse zandboa).

De slangen worden gehouden in een terrarium van 100x50x50 cm met een zandlaag van ongeveer 15 cm. Overdag is de luchttemperatuur 29-35⁰C, terwijl de temperatuur in de zandlaag 27-36⁰C is.

's Nachts is de luchttemperatuur 23⁰C en die van de bodem 23,5⁰C.

De beide ouderdieren zijn in gevangenschap gekweekt. Het vrouwtje is ongeveer 18 maanden oud, het mannetje ongeveer 4 jaar.

De dieren leefden in gescheiden terraria totdat ze op 7 juni 1983 bij elkaar gezet werden. Daarna hebben tussen 8 juni 1983 en 10 juli 1983 paringen plaatsgevonden.

Het vrouwtje at op 15 oktober 1983 voor de laatste keer tot de geboorte, een half-was muis.

Op 25 oktober 1983 waren 17 jongen (F2) geboren met een gemiddeld geboortegewicht van 8 gram en een gemiddelde lengte van 19 cm.

De eerste vervelling vond plaats op 3 november 1983 en vanaf 7 november 1983 aten alle jongen zelfstandig nestmuisjes, zodat dwangvoederen niet nodig was.

Met zeer veel dank aan Ton Markx (Veghel NL), die mij na lang aarzelen het mannetje voor deze kweekpoging heeft afgestaan.

Heinz Lamers, Talstrasse 93, 4020 Meltmann, West-Duitsland.

Boaedon fuliginosus.

De slangen, beide van de eerste generatie en ouder dan vijf jaar, worden gehouden in een terrarium van 65x40x50 cm (lxbxh). De dagtemperatuur wordt gehandhaafd op 26-29°C, terwijl de temperatuur 's nachts daalt naar 20-23°C. Er werd geen stimulus gebruikt om een paring te bewerkstelligen. Het vrouwtje bleef gedurende de hele dracht eten. Op 23 mei 1983 werden vijf eieren gelegd. Ze werden bebroed bij 30°C en waren respectievelijk 5,0 - 4,3 - 5,0 - 5,0 - 3,3 cm lang. Het jong in het kleinste ei stierf, de vier anderen kropen op 18 juli 1983 uit het ei.

De jongen wogen 5.5, 3.0, 5.5 en 6 gram en waren respectievelijk 24, 20, 25, en 25 cm lang. Het kleinste jong stierf na twee weken, de drie anderen moesten gedwangvoederd worden met net-gedode nestmuisjes.

P. Hartmann, Jr. & B. Steiner, World Snake Study-centre, Wilbrunnenstrasse 39, 6314 Unterägeri, Zwitserland.

Elaphe guttata guttata.

De ouders (beide eerste generatie in gevangenschap) zijn meer dan zeven jaar oud. Ze zijn ondergebracht in een terrarium van 80x40x50 cm (lxbxh) waarin de temperatuur overdag 26-29°C en 's nachts 20-23°C. Er is geen stimulatie voor de paring gebruikt. Het vrouwtje bleef wel eten gedurende de dracht, maar de hoeveelheid was minder dan nor-

maal.

Negen eieren werden gelegd op 27 augustus 1983 en bebroed bij 30⁰C. Op 23 oktober kwamen acht jonge slangen uit de eieren; het negende ei bevatte een dood jong. Vijf babies werden gedwangvoederd met net-gedode nestmuisjes, de drie anderen aten zelfstandig.

Er is met deze ouderdieren al eerder gekweekt.

P. Hartmann, Jr. & B. Steiner, World Snake Study-centre, Wilbrunnenstrasse 39, 6314 Unterägeri, Zwitserland.

Bitis arietans.

Het ouderpaar is zeven jaar oud, van de tweede generatie in gevangenschap. Ze hebben gedurende de laatste vier jaar elk jaar voor jongen gezorgd. Ze worden gehouden in een bak van 150x60x100 cm (lxbxh) met een dagtemperatuur van 26-30⁰C welke 's nachts daalt tot 20 à 23⁰C.

De dieren werden niet kunstmatig tot paring gestimuleerd. Het vrouwtje bleef gedurende de dracht normaal eten.

Op 5 augustus 1983 worden zestien jongen geboren. Ongeveer 30% daarvan moest worden gedwangvoederd met net-gedode nestmuisjes, maar het grootste deel at zelfstandig nestmuisjes.

P. Hartmann, Jr. & B. Steiner, World Snake Study-centre, Wilbrunnenstrasse 39, 6314 Unterägeri, Zwitserland.

Trimeresurus albolabris.

De ouders zijn beide vier jaar oud en van de tweede generatie in gevangenschap. Ze worden gehouden in een terrarium van 65x40x50 cm (lxbxh). De temperatuur is overdag 26-32⁰C, 's nachts neemt ze af tot 20-23⁰C.

Er werd geen stimulus gebruikt om de copulatie te

induceren, het vrouwtje bleef gedurende de hele dracht normaal eten.

Op 16 augustus 1983 werden drie jongen geboren. Twee van hen stierven al in de eerste levensweek, de derde werd gedwangvoederd met net-gedode nestmuisjes.

P. Hartmann, Jr. & B. Steiner, World Snake Study-centre, Wilbrunnenstrasse 39, 6314 Unterägeri, Zwitserland.

Crotalus ruber x atrox

De ouders zijn beide ongeveer zeven jaar oud. Ze zijn van de derde generatie in gevangenschap gekweekt en hebben al drie maal eerder jongen voortgebracht. Ze worden gehouden in een terrarium van 160x40x50 cm (lxbxh), met een dagtemperatuur van 26-29°C en een nachttemperatuur van 20-23°C. Er is geen stimulus gebruikt om de dieren tot paren te brengen. Het vrouwtje bleef gedurende de hele zwangerschap eten. Op 23 juli 1983 werden twee levende en drie dode jongen geboren. Er waren ook drie niet-bevruchte eieren. Van de twee jongen at de ene zelfstandig babymuisjes, de ander moest gedwangvoederd worden met net-gedode nestmuisjes.

P. Hartmann, Jr. & B. Steiner, World Snake Study-centre, Wilbrunnenstrasse 39, 6314 Unterägeri, Zwitserland.