

LITERATUUR

In deze rubriek wordt U geïnformeerd over nieuwe literatuur op het gebied van terrariumverzorging en de systematiek van slangen. Ook kan (op speciaal verzoek) af en toe een literatuuroepgaaf geplaatst worden over de determinatie van de slangen van een bepaald land of van een systematische groep. Tips voor nieuwe literatuur en boekbesprekingen ingezonden door lezers zijn van harte welkom. Redakteur: Ed Prüst, Voorstraat 61, 3512 AK Utrecht. Tel. 030-319347.

Agkistrodon halys caraganus (Eichwald 1831) im Terrarium; R. Hübers & M. Fricke-Hübers. Herpetofauna (Ludwigsburg), 1983, Vol. 5 (26): 25-27.

In september 1981 kregen de auteurs een paartje van deze dieren (mannetje: 60 cm, vrouwtje: 50 cm). Deze dieren weigerden in 1981 voer en werden van eind oktober tot midden maart in winterrust gehouden bij ongeveer 12-15°C. Daarna werden ze in een terrarium geplaatst (60x40x40 cm). De temperatuur overdag was 22-24°C, 's nachts circa 5°C lager bij een relatieve luchtvochtigheid van 70%. Langzaam werden de dieren alerter en begonnen meer te eten. Op 20 maart en 5 april volgden dan paringen. Vanaf midden juni werd het vrouwtje duidelijk dikker en stopte met eten.

Op 23 augustus werden drie jongen geboren, met ongeveer een uur tussenruimte. Deze waren ongeveer 13 cm lang en vervelden direkt. Ze moesten gedwangvoederd worden. Dit gebeurde met runderhart en jonge muisjes. Ook de jonge dieren kregen een winterrust bij 12-15°C gedurende 8-10 weken. Op 3 september en 24 oktober waren er weer paringen bij de ouders.

De auteurs bevelen aan de dieren in kleine

groepjes, of liever, paren te houden om stress te voorkomen.

Haltung und Zucht von *Boiga trigonata*; I. & J. Bulian. Herpetofauna (Ludwigsburg), 1983, Vol. 5 (27): 13-15.

In augustus 1979 werden twee mannetjes (51 en 54 cm) aangeschaft en in februari 1980, één vrouwtje (80 cm). Ze kwamen in een terrarium van 75x70x80 cm, dat uitgerust was met een waterbak, een sterk vertakte klimboom en een twee cm dikke laag turf. Het licht was 12 uur per dag aan en kwam van twee 20 Watt TL-buizen. Verder was er een 65 Watt verwarmingskabel. De dagtemperatuur was 25-27°C, 's nachts 18-22°C. Om de twee à drie dagen werd de bodem besproeid. De dieren werden gevoerd met pasgeboren tot halfvolwassen muizen. In maart 1980 werden paringen gezien. De eerste eieren (negen) werden pas in augustus gelegd. Deze werden uitgebroed in een kippenbroedmachine (29°C) in een plastic doos, gevuld met vochtig turf. In de deksel waren gaatjes gemaakt en eens per week werd het turf bevochtigd. De jongen die na ongeveer vijf weken geboren werden, waren ongeveer 23 cm lang en wogen ongeveer 3 g. Bij vier latere legsels waren ze ongeveer 25 cm lang en ongeveer 4 g. Alle jongen moesten gedwangvoederd worden. Gebruikt werden repen runderhart, muizepoten en muizestaarten. De muizestaarten voldoen het best. Sinds februari 1983 eten de jongen uit 1980 zelfstandig muizen.