
HET HOUDEN EN KWEKEN MET *AGKISTRODON BILINEATUS*
BILINEATUS

Door: Harm Boerema, Woonschepenhaven st. 7/71,
9723 CJ Groningen.

Mijn eerste aanschaf van twee jonge dieren, \pm 35 cm lang, in 1985 bleek uit twee vrouwtjes te bestaan. Mooie dieren die goed aten en snel groeiden. Ik hield ze aanvankelijk samen in één bak van 35x35x40 (lxbxh).

Al na een jaar heb ik een mannetje kunnen bemachtigen van ongeveer dezelfde lengte als de twee soortgenoten (toen reeds \pm 75 á 80 cm).

Daar ik wist, dat dit een nagekweekt dier was en dat het kerngezond was, heb ik op goed geluk alle dieren bij elkaar gezet in een bak van 75x50x50 cm (lxbxh). Deze bak was voorzien van een bodemverwarming en bovenin een spot van 75 Watt voor een gerichte warmtebundel op een partij flagstones waar de dieren vaak lagen te zonnen. De temperatuur bedroeg hier plaatselijk 35°C. De luchttemperatuur bedroeg van april tot september overdag 27 à 28°C en 's nachts 20°C. Van september tot april overdag \pm 20°C en 's nachts 15°C. Dus hier gold slechts een matige afkoeling en géén echte winterrust.

Ik heb de eerste paring waargenomen met vrouwtje A op 12 september 1987 en later weer op 24 september 1987. Met vrouwtje B heb ik een paring waargenomen op 22 oktober 1987, die in tegestelling tot de andere paringen lang heeft geduurd, (bijna 2½ uur), waarbij het mannetje tot bloedens toe door het vrouwtje door de hele bak werd gesleept.

De dieren aten toen reeds volwassen ratten en maten ongeveer 120 cm, het mannetje was iets kleiner. Exacte maten kom ik vanwege hun agressief gedrag niet nemen.

Beide vrouwtjes hebben tot de laatste dag voor de

geboorte van de jongen gegeten. De eerste jongen (vrouwtje A) werden geboren op 25 april 1988, 6 exemplaren. Vrouwtje B beviel op 29 april van 8 jongen, waarvan twee stuks een ééneiïge tweeling, die ik naderhand moest bevrijden uit het vlies. Alle jonge dieren hadden een lengte van \pm 20 cm en aten na de eerste vervelling al snel eendagsmuisjes.