

V ERZORGINGSSTAAT

SLANGEN VOOR BEGINNERS:

- Zijn niet giftig
- Zijn gemakkelijk te hanteren
- Zijn nauwelijks gevoelig voor stress
- Zijn goede eters
- Eten gemakkelijk aan te schaffen (of zelf te kweken) prooidieren
- Stellen beperkte eisen aan de behuizing
- Stellen beperkte eisen aan klimatologische omstandigheden
- Zijn zonder veel moeite tot paring aan te zetten
- Zijn relatief gemakkelijk groot te brengen

VERZORGINGSSHEMA:

Latijnse naam	Lamprophis fuliginosus
Nederlandse naam	Afrikaanse huisslang
Maximaal formaat	Man 66 cm Vrouw 80 cm
Verspreiding	Het grootste gedeelte van het Afrikaanse continent. Van Zuid-Egypte en Marokko door heel Zuid-Afrika.
Woonomgeving	Grasland, savannes, steppe, hooggelegen droge gebieden, stedelijke gebieden.
Afmeting terrarium	L 60cm B 40cm H 40cm
Inrichting terrarium	Eenvoudige inrichting met een droog bodemsubstraat, enkele schuilplaatsjes en een waterbakje.
Min. max. dagtemperatuur °C	24 – 30°C
Min. max. nachttemperatuur °C	18 – 22°C
Luchtvochtigheid	50 – 70%
Prooidieren	Muizen en jonge ratjes die vaak zowel dood als levend worden geaccepteerd.
Voedingsfrequentie	1 prooi elke 7 tot 10 dagen.
Wanneer geslachtsrijp	Mannetjes bij 2 jaar. Vrouwjes bij 2,5 tot 3 jaar.
Paringstimulans	Niet nodig.
Draagtijd	50 tot 60 dagen.
Eierlegend of eierlevendbarend	Eierlegend.
Aantal jongen per worp	Tot 16 eieren.
Voorzieningen ten behoeve van het eieren leggen	Zodra de zwangere vrouwjes stoppen met eten kun je het beste een legbox in het terrarium zetten voorzien van een vochtig substraat (bijv. bevochtigd vermiculite, cocospaet of houtkrullen)
Uitbroeden van eieren	Bij een temperatuur van 27 - 28°C. Tijdsduur: 50 – 60 dagen
OPKWEKEN VAN JONGEN	
Individueel houden?	Het beste is om elk jong apart te huisvesten.
Afmeting terrarium	l-20cm b-15cm h-10cm
Inrichting terrarium	Droge bodembedekking, schuilplaatsje en drinkbakje.
Min. max. dagtemperatuur °C	24 – 30°C
Min. max. nachttemperatuur °C	20 - 24°C
Luchtvochtigheid	50 – 70%
Prooidieren	Pasgeboren naakte muisjes (pinkies) die zowel dood als levend geaccepteerd worden.
Ingevuld door:	Emanuele Cimatti.





SNAKES FOR BEGINNERS:

- Are not venomous
- Are easy to handle
- Are hardly sensitive for stress
- Are good eaters
- Are easy to buy (or breed self) prey
- Requires limited needs for their housing
- Requires limited needs for climate & conditions
- Are easy to start with breeding
- Are relatively easy to bring to adulthood

CARE SCHEMA :

Latin name	Lamprophis fuliginosus
English name	Brown House Snake
Maximum format	66 cm male, 80 female
Distribution	Most of African continent, from southern Egypt and Morocco as far as all area of South Africa
Habitat	Highveld grasslands, savannah, steppe, arid karroid regions, urban areas
Terrarium requirements	Very simple cage, dry substrate, some barks as hide-boxes, a small container with water
Terrarium decorations	Not necessary
Min. Max. daytime temperature °C	24-30°C
Min. max. night time temperature °C	18-22°C
Humidity	50-70%
Prey	Mice, young rats, dead or alive
Feeding Frequency	One prey every 7-10 days
Matures	Male 2 years old, female 2.5-3 years old
Paring Stimulation	Not necessary
Gestation Period	50-60 days
Egg-laying or egg-live birth	Egg laying
Number of young per litter	Up to 16 eggs
Provisions to meet conditions necessary for egg-laying	When gravid female stops to eat, it is good to put a deposition box inside the terrarium, as a small box with into a humid substrate (peat, vermiculite)
Hatching of eggs	50-65 days

RAISING OF YOUNG:

Hold individually	Best
Terrarium requirements	Very simple cage, dry substrate, some barks as hide-boxes, a small container with water
Terrarium decorations	Not necessary
Min. Max. daytime temperature °C	24-30°C
Min. max. night time temperature °C	20-24°C
Humidity	50-70%
Prey	Newborn mice (Apinkies®), dead or alive

Filled in by Emanuele Cimatti